

レジメン名		濾胞性リンパ腫G-CHOP療法 1クール													
略名		G-CHOP(1)											1クールの日数	21日	
適応病名		濾胞性リンパ腫											予定クール回数	1回(次クールへ移行)	
薬品名	1日投与量	計算投与量	投与方法	投与時間	day 1	day 2	...	day 5	...	day 8	...	day 15	...	day 21	実投与量
生理食塩液	50 mL	50 mL	div	keep	↑					↑		↑			
プレドニゾン	100 mg/body	100 mg	経口	※ ¹	↓	↓	↓	↓							
デキサート	16.5 mg	16.5 mg	div	30分						↑		↑			
生理食塩液	100 mL	100 mL		※ ¹											
アセトアミノフェン	400 mg	400 mg	経口	※ ¹	↑					↑		↑			
レスタミン	30 mg	30 mg	経口	※ ¹	↑					↑		↑			
ガザイバ	1000 mg	1000 mg	div	※ ²	↓					↓		↓			1000
生理食塩液	210 mL	210 mL													
ガザイバ投与後30分間経過観察															
グラニセトロン	3mg/100mL	3mg/100mL	div	30分	↑										
オンコピン	1.4 mg/m ²	mg	iv	ゆっくりと	↓										
生理食塩液	20 mL	20 mL													(最大2mg)
ドキシソルピシン	50 mg/m ²	mg	div	30分	↓										
生理食塩液	100-投与量mL	100 mL													100 mL
エンドキサン	750 mg/m ²	mg	div	120分	↓										
生理食塩液	500 mL	500 mL													
ソルデム3A	200 mL	200 mL	div	120分	↑										

※¹ステロイドはガザイバ投与1時間前まで、抗ヒスタミン薬と解熱鎮痛剤はガザイバ投与30～60分前までに投与すること

※²初回投与: 50mg/時で開始し、30分毎に50mg/時ずつ、最大400mg/時まであげることができる

2回目以降: 前回の投与でG2以上のinfusion reactionが発現しなかった場合、100mg/時で開始し、30分毎に100mg/時ずつ、最大400mg/時まで上げることができる

ガザイバとCHOPを同日に行う場合 ガザイバ当日はPSLは朝1回で内服する

ガザイバとCHOPを別日に行う場合 ガザイバ投与前にデキサートを投与する