

レジメン名		濾胞性リンパ腫G-CHOP療法 2-6クール														
略名		G-CHOP(2-6)		1クールの日数		21日										
適応病名		濾胞性リンパ腫		予定クール回数		5回(次クールへ移行)										
薬品名	1日投与量	計算投与量	投与方法	投与時間	day 1	day 2	day ...	day 5	day ...	day 8	day ...	day 15	day ...	day 21	実投与量	
生理食塩液	50 mL	50 mL	div	keep	↑											
プレドニゾン	100 mg/body	100 mg	経口	※ ¹	↓	↓	↓	↓								
アセトアミノフェン	400 mg	400 mg	経口	※ ¹	↑											
レスタミン	30 mg	30 mg	経口	※ ¹	↑											
ガザイバ	1000 mg	1000 mg	div	※ ²	↓										1000	
生理食塩液	210 mL	210 mL														

ガザイバ投与後30分間経過観察

グラニセトロン	3mg/100mL	3mg/100mL	div	30分	↑										
オンコビン	1.4 mg/m ²	#REF! mg	iv	ゆっくりと	↓										
生理食塩液	20 mL	20 mL													(最大2mg)
ドキシソビシン	50 mg/m ²	#REF! mg	div	30分	↓										
生理食塩液	100-投与量mL	#REF! mL													100 mL
エンドキサン	750 mg/m ²	#REF! mg	div	120分	↓										
生理食塩液	500 mL	500 mL													
ソルデム3A	200 mL	200 mL	div	120分	↑										

※¹ステロイドはガザイバ投与1時間前まで、抗ヒスタミン薬と解熱鎮痛剤はガザイバ投与30~60分前までに投与すること

※²初回投与:50mg/時で開始し、30分毎に50mg/時ずつ、最大400mg/時まであげることができる

2回目以降:前回の投与でG2以上のinfusion reactionが発現しなかった場合、100mg/時で開始し、30分毎に100mg/時ずつ、最大400mg/時まで上げることができる

【投与時間短縮法】第1サイクルの投与でGrade 3以上のinfusion reactionが発現しなかった場合は、

2サイクル目から最初の30分は100mg/時で開始し、その後最大 900mg/時まで上げることができる。

ガザイバとCHOPを同日に行う場合 ガザイバ当日はPSLは朝1回で内服する

ガザイバとCHOPを別日に行う場合 ガザイバ投与前にデキサート投与する