

レジメン名		濾胞性リンパ腫G-CHOP療法 7-8クール													
略名		G-CHOP(7-8)		1クールの日数										21日	
適応病名		濾胞性リンパ腫		予定クール回数										2回	
薬品名	1日投与量	計算投与量	投与方法	投与時間	day 1	day 2	day ...	day 5	day ...	day 8	day ...	day 15	day ...	day 21	実投与量
生理食塩液	50 mL	50 mL	div	keep	↑										
デキサート	16.5 mg	16.5 mg	div	30分	↑										
生理食塩液	100 mL	100 mL		※ ¹	↑										
アセトアミノフェン	400 mg	400 mg	経口	※ ¹	↑										
レスタミン	30 mg	30 mg	経口	※ ¹	↑										
ガザイバ	1000 mg	1000 mg	div	※ ²	↓										1000
生理食塩液	210 mL	210 mL													

ガザイバ投与後30分間経過観察

※¹ステロイドはガザイバ投与1時間前まで、抗ヒスタミン薬と解熱鎮痛剤はガザイバ投与30～60分前までに投与すること

※²初回投与:50mg/時で開始し、30分毎に50mg/時ずつ、最大400mg/時まであげることができる

2回目以降:前回の投与でG2以上のinfusion reactionが発現しなかった場合、100mg/時で開始し、30分毎に100mg/時ずつ、最大400mg/時まで上げることができる

【投与時間短縮法】第1サイクルの投与でGrade 3以上のinfusion reactionが発現しなかった場合は、2サイクル目から最初の30分は100mg/時で開始し、その後最大 900mg/時まで上げることができる。