

レジメン名	濾胞性リンパ腫G-CVP療法 1クール														実投与量	
略名	G-CVP(1)			1クールの日数												21日
適応病名	濾胞性リンパ腫			予定クール回数												1回(次クールへ移行)
薬品名	1日投与量	計算投与量	投与方法	投与時間	day 1	day 2	day ...	day 5	day ...	day 8	day ...	day 15	day ...	day 21		
生理食塩液	50 mL	50 mL	div	keep	↑							↑		↑		
プレドニゾン	100 mg/body	100 mg	経口	※ ¹	↓	↓	↓	↓								
デキサート	16.5 mg	16.5 mg	div	30分								↑		↑		
生理食塩液	100 mL	100 mL		※ ¹												
アセトアミノフェン	400 mg	400 mg	経口	※ ¹	↑							↑		↑		
レスタミン	30 mg	30 mg	経口	※ ¹	↑							↑		↑		
ガザイバ	1000 mg	1000 mg	div	※ ²	↓							↓		↓		
生理食塩液	210 mL	210 mL														
ガザイバ投与後30分間経過観察																
グラニセトン	3mg/100mL	3mg/100mL	div	30分	↑											
オンコピン	1.4 mg/m2	mg	iv	ゆっくと	↓											
生理食塩液	20 mL	20 mL												(最大2mg)		
エンドキサン	750 mg/m2	mg	div	120分	↓											
生理食塩液	500 mL	500 mL														
ソルデム3A	200 mL	200 mL	div	120分	↑											

※¹ステロイドはガザイバ投与1時間前まで、抗ヒスタミン薬と解熱鎮痛剤はガザイバ投与30～60分前までに投与すること

※²初回投与:50mg/時で開始し、30分毎に50mg/時ずつ、最大400mg/時まであげることができる

2回目以降:前回の投与でG2以上のinfusion reactionが発現しなかった場合、100mg/時で開始し、30分毎に100mg/時ずつ、最大400mg/時まであげることができる

ガザイバとCHOPを同日に行う場合 ガザイバ当日はPSLは朝1回で内服する

ガザイバとCHOPを別日に行う場合 ガザイバ投与前にデキサートを投与する