

レジメン名	濾胞性リンパ腫ガザイバ維持療法												
略名	ガザイバ維持療法										1クールの日数		56 日
適応病名	濾胞性リンパ腫										予定クール回数		12 回
薬品名	1日投与量	計算投与量	投与方法	投与時間	day	day	実投与量						
					1								
生理食塩液	50 mL	50 mL	div	keep	↑								
デキサート	16.5 mg	16.5 mg	div	30分	↑								
生理食塩液	100 mL	100 mL		※ ¹									
アセトアミノフェン	200 mg	200 mg	経口	※ ¹	↑								
レスタミン	30 mg	30 mg	経口	※ ¹	↑								
ガザイバ	1000 mg	1000 mg	div	※ ²	↓								1000
生理食塩液	210 mL	210 mL											
ガザイバ投与後30分間経過観察													

※¹ステロイドはガザイバ投与1時間前まで、抗ヒスタミン薬と解熱鎮痛剤はガザイバ投与30～60分前までに投与すること

※²初回投与: 50mg/時で開始し、30分毎に50mg/時ずつ、最大400mg/時まであげることができる

2回目以降: 前回の投与でG2以上のinfusion reactionが発現しなかった場合、100mg/時で開始し、30分毎に100mg/時ずつ、最大400mg/時まで上げることができる

【投与時間短縮法】第1サイクルの投与でGrade 3以上のinfusion reactionが発現しなかった場合は、

2サイクル目から最初 の30分は100mg/時で開始し、その後最大 900mg/時まで上げることができる。