

レジメン名	Pola-BR療法C2-6										
略名	Pola-BR C2-6			1クールの日数							21日
適応病名	びまん性大細胞型B細胞リンパ腫			予定クール回数							5回
薬品名	1日投与量	計算投与量	投与方法	投与時間	day 1	day 2	day 3	day 4	day 5	day 21	実投与量
ブルフェン	200 mg	200 mg	経口		↑						
レスタミン	30 mg	30 mg	経口		↑						
生理食塩液	100 mL	100 mL	keep		↑	↑					
リツキシマブ	375 mg/m <sup>2</sup>	mg	div		↓						
生理食塩液	500 mL	500 mL	(1mg/mLに調製								
生理食塩液	100 mL	100 mL	div	30分	↑						
<b>リツキシマブ投与後30分間経過観察</b>											
ポラツズマブベドチン 注射用水	1.8 mg/kg (ポラツズマブ溶解用)	mg	div	30~ 90分	↓						
生理食塩液	60 mL	60 mL									
生理食塩液	100 mL	100 mL	div	30分	↑						
<b>ポラツズマブベドチン投与後30分間経過観察</b>											
グラニセトロン	3mg/100mL	3mg/100mL	div	30分	↑	↑					
デキサート	6.6 mg	6.6 mg									
<b>ベンダムスチン60分投与の場合</b>											
ベンダムスチン	90 mg/m <sup>2</sup>	mg	div	60分	↓	↓					
生理食塩液	250mL-投与量mL	250 mL									250 mL
<b>ベンダムスチン10分投与の場合</b>											
ベンダムスチン	90 mg/m <sup>2</sup>	mg	div	10分	↓	↓					
生理食塩液	50 mL	50 mL									
生理食塩液	50 mL	50 mL	div	フラッシュ用	↑	↑					
ヘパリンNaロック	10 mL	10 mL			↑						