

レジメン名	Pola-R-CHP療法 1-6クール										
略名	Pola-R-CHP(1-6)			1クールの日数						21日	
適応病名	びまん性大細胞型B細胞リンパ腫			予定クール回数						6回(次クールへ移行)	
薬品名	1日投与量	計算投与量	投与方法	投与時間	day 1	day 2	day 3	day 4	day 5	day 21	実投与量
ブルフェン	200 mg	200 mg	経口		↑						
レスタミン	30 mg	30 mg	経口		↑						
生理食塩液	100 mL	100 mL	keep		↑						
リツキシマブ	375 mg/m <sup>2</sup>	mg	div		↓						
生理食塩液	500 mL	500 mL	(1mg/mLに調製)								
生理食塩液	100 mL	100 mL	div	30~90分	↑						
<b>リツキシマブ投与後30分間経過観察</b>											
ポラツズマブベドチン 注射用水	1.8 mg/kg (ポラツズマブ溶解用)	mg	div	30~90分	↓						
生理食塩液	60 mL	60 mL									
生理食塩液	100 mL	100 mL	div	30~90分	↑						
<b>ポラツズマブベドチン投与後90分間経過観察(2回目以降は30分)</b>											
グラニセトロン	3mg/100mL	3mg/100mL	div	30分	↑						
ドキソルビシン	50 mg/m <sup>2</sup>	mg	div	30分	↓						
生理食塩液	100mL-投与量mL	100 mL									
エンドキサン	750 mg/m <sup>2</sup>	mg	div	3時間	↓						
生理食塩液	500 mL	500 mL									
プレドニゾン	100 mg/body	100 mg	経口		↓	↓	↓	↓	↓		

\* リツキシマブとポライビーを同日にしない場合には、投与後の経過観察は30分でよい