

レジメン名	アザシチジン+ベネトクラクス療法														
略名	AZA+Ven			1クールの日数											28日
適応病名	急性骨髄性白血病			予定クール回数											PDまで
薬品名	1日投与量	計算投与量	投与方法	投与時間	day 1	day 2	day 3	day 4	day 5	day 6	day 7	day 8	day 9	day 28	実投与量
静注の場合															
生理食塩液	50 mL	50 mL	div	keep	↑	↑	↑	↑	↑			↑	↑		
グラニセトロン	3mg/100mL	3mg/100mL	div	30分	↑	↑	↑	↑	↑			↑	↑		
アザシチジン	75 mg/m ²	mg	div	10分	↓	↓	↓	↓	↓			↓	↓		
注射用水	(10mL/Vで溶解)	(10mL/Vで溶解)													0 mL
生理食塩液	50 mL	50 mL													(抜き取り量)
皮下注の場合															
ナゼアOD錠	0.1 mg		経口		↑	↑	↑	↑	↑			↑	↑		
アザシチジン	75 mg/m ²	mg	sc		↓	↓	↓	↓	↓			↓	↓		
注射用水	(4mL/Vで溶解)	(4mL/Vで溶解)													0 mL
															(抜き取り量)
ベネトクラクス錠	mg/day	0 mg/day	経口	1日1回食後	100	200	400	→	以降400mgで継続						

※併用薬にCYP3A4阻害薬がある場合には、併用薬の阻害強度によりベネトクラクスの用量が異なります。
 中等度のCYP3A4阻害薬併用時: 50mg→100mg→200mgで用量漸増、200mgで維持投与
 強いCYP3A4阻害薬併用時: 10mg→20mg→50mgで用量漸増、50mgで維持投与
 ※腫瘍崩壊症候群の予防のため、尿酸排泄薬の使用とハイドレーションを行う。

