レジメン名	ビキセオス(寛解導入療法)		
略名	ビキセオス(寛解導入療法)	1クールの日数	下記参照
適応病名	急性骨髄性白血病	予定クール回数	最大2サイクル

1サイクル目

薬品名	1日投与量	計算投与量	投与方法	投与時間	day 1	day 2	day 3	day 4	day 5	day 6	day 7	実投与量
生理食塩液	100 mL	100 mL	div	keep	↑		↑		↑			
グラニセトロン	3mg/100mL	3mg/100mL	div	30分	↑		↑		↑			
ビキセオス ＊ 注射用水 生理食塩液	100 ユニット/㎡ 1Vあたり19mLで溶解 500 mL	ユニット/㎡ 1Vあたり19mLで溶解 500 mL	div	90分	↓		↓		↓			

2サイクル目 （1サイクル目に寛解に到達しなかった患者で、1サイクル目の投与開始から2～5週間後）

薬品名	1日投与量	計算投与量	投与方法	投与時間	day 1	day 2	day 3	day 4	day 5	day 6	day 7	実投与量
生理食塩液	100 mL	100 mL	div	keep	↑		↑					
グラニセトロン	3mg/100mL	3mg/100mL	div	30分	↑		↑					
ビキセオス ＊ 注射用水 生理食塩液	100 ユニット/㎡ 1Vあたり19mLで溶解 500 mL	ユニット/㎡ 1Vあたり19mLで溶解 500 mL	div	90分	↓		↓					