レジメン管理番号:22-22-03

レジメン名	ビキセオス(地固め療法)		
略名	ビキセオス(地固め療法)	1クールの日数	下記参照
適応病名	急性骨髄性白血病	予定クール回数	最大2サイクル

1サイクル目 （最後の寛解導入療法開始から5～8週間後）

薬品名	1日投与量	計算投与量	投与方法	投与時間	day 1	day 2	day 3	day 4	day 5	day 6	day 7	実投与量
生理食塩液	100 mL	100 mL	div	keep	↑		↑					
グラニセトロン	3mg/100mL	3mg/100mL	div	30分	↑		↑					
ビキセオス ＊ 注射用水 生理食塩液	65 ユニット/㎡ 1Vあたり19mLで溶解 500 mL	ユニット/㎡ 1Vあたり19mLで溶解 500 mL	div	90分	↓		↓					

2サイクル目 （1サイクル目の投与開始後に病態が進行していない患者で、1サイクル目の開始から5～8週間後）

薬品名	1日投与量	計算投与量	投与方法	投与時間	day 1	day 2	day 3	day 4	day 5	day 6	day 7	実投与量
生理食塩液	100 mL	100 mL	div	keep	↑		↑					
グラニセトロン	3mg/100mL	3mg/100mL	div	30分	↑		↑					
ビキセオス ＊ 注射用水 生理食塩液	65 ユニット/㎡ 1Vあたり19mLで溶解 500 mL	ユニット/㎡ 1Vあたり19mLで溶解 500 mL	div	90分	↓		↓					