

レジメン名	Dara-VMP療法 1クール																	
略名	Dara-VMP C1			1クールの日数		42 日												
適応病名	多発性骨髄腫			予定クール回数		1回(次レジメンへ移行)												
薬品名	1日投与量	計算投与量	投与方法	投与時間	day 1	day 2	day 3	day 4	day 8	day 11	day 15	day 22	day 25	day 29	day 32	day 36	day 42	実投与量
デキサメタゾン	20 mg	20 mg	経口/div		↑				↑		↑	↑		↑		↑		
アセトアミノフェン	650~1000 mg	650~1000 mg	経口		↑				↑		↑	↑		↑		↑		
レスタミン	30 mg	30 mg	経口		↑				↑		↑	↑		↑		↑		
点滴静注の場合																		
生理食塩液	50 mL	50 mL	div	keep	↑				↑		↑	↑		↑		↑		
ダラツムマブ	16 mg/kg	mg	div	7時間	↓													
生理食塩液	1000-投与量 mL	1000 mL																
ダラツムマブ	16 mg/kg	mg	div	4時間					↓		↓	↓		↓		↓		
生理食塩液	500-投与量 mL	500 mL																
ボルテゾミブ	1.3 mg/m2	mg	sc		↓			↓	↓	↓		↓	↓	↓	↓			
生理食塩液	実投与量で自動計算	0 mL																
メルファラン	9 mg/m2	mg	経口		↓	↓	↓	↓										
プレドニゾン	60 mg/m2	mg	経口			↓	↓	↓										

皮下注の場合

ダラツムマブ	1800 mg	1800 mg	sc		↓			↓		↓	↓		↓		↓		↓	
ボルテゾミブ	1.3 mg/m2	mg	sc		↓			↓	↓	↓		↓	↓	↓	↓			
生理食塩液	実投与量で自動計算	0 mL																
メルファラン	9 mg/m2	mg	経口		↓	↓	↓	↓										
プレドニゾン	60 mg/m2	mg	経口			↓	↓	↓										

デキサメタゾン アセトアミノフェン レスタミンはダラツムマブ開始1-3時間前に投与すること

ダラツムマブ点滴静注投与速度

投与時期	投与開始からの投与速度(mL/時間)	投与開始からの投与速度(mL/時間)			
		0-1時間	1-2時間	2-3時間	3時間以降
初回投与	1000mL	50	100	150	200
2回目投与	500mL				
3回目投与以降	500mL	100	150	200	