

レジメン名	DBd療法 1クール																				
略名	DBd(1クール)			1クールの日数														21 日			
適応病名	多発性骨髄腫			予定クール回数							1回(次レジメンへ移行)										
薬品名	1日投与量	計算投与量	投与方法	投与時間	day 1	day 2	day ...	day 4	day 5	day ...	day 8	day 9	day ...	day 11	day 12	day ...	day 15	day ...	day 21	実投与量	
デキサメタゾン	20 mg	20 mg	経口/div		↑	↑		↑	↑		↑	↑		↑	↑		↑				
アセトアミノフェン	650~1000 mg	650~1000 mg	経口/div		↑							↑						↑			
レスタミン	30 mg	30 mg	経口		↑							↑						↑			
モンテルカスト	10 mg	10 mg	経口		↑																

点滴静注の場合

生理食塩液	50 mL	50 mL	div	keep	↑							↑										
ダラツムマブ	16 mg/kg	mg	div	7時間	↓																	
生理食塩液	1000-投与量 mL	1000 mL																				
ダラツムマブ	16 mg/kg	mg	div	4時間								↓										
生理食塩液	500-投与量 mL	500 mL																				
ボルテゾミブ	1.3 mg/m2	mg	sc		↓			↓				↓										
生理食塩液	実投与量で自動計算	0 mL																				

皮下注の場合

ダラツムマブ	1800 mg	1800 mg	sc		↓							↓										
ボルテゾミブ	1.3 mg/m2	mg	sc		↓			↓				↓										
生理食塩液	実投与量で自動計算	0 mL																				

デキサメタゾン アセトアミノフェン レスタミンはダラツムマブ開始1-3時間前に投与すること

ダラツムマブ点滴静注投与速度

投与時期	投与開始からの投与速度(mL/時間)	投与開始からの投与速度(mL/時間)			
		0-1時間	1-2時間	2-3時間	3時間以降
初回投与	1000mL				
2回目投与	500mL	50	100	150	200
3回目投与以降	500mL	100	150	200	