

レジメン名	DBd療法 2-3クール																	
略名	DBd(2-3クール)			1クールの日数											21 日			
適応病名	多発性骨髄腫			予定クール回数											2回(次レジメンへ移行)			
薬品名	1日投与量	計算投与量	投与方法	投与時間	day	day	day	day	day	day	day	day	day	day	day	day	day	実投与量
					1	2	...	4	5	...	8	9	...	11	12	...	15	
デキサメタゾン	20 mg	20 mg	経口/div		↑	↑					↑	↑						
アセトアミノフェン	650~1000 mg	650~1000 mg	経口/div		↑							↑						
レスタミン	30 mg	30 mg	経口		↑							↑						

点滴静注の場合

生理食塩液	50 mL	50 mL	div	keep	↑							↑					↑	
ダラツムマブ	16 mg/kg	mg	div	4時間	↓							↓					↓	
生理食塩液	500-投与量 mL	500 mL																
ボルテゾミブ	1.3 mg/m2	mg	sc		↓							↓					↓	
生理食塩液	実投与量で自動計算	0 mL																

皮下注の場合

ダラツムマブ	1800 mg	1800 mg	sc		↓							↓					↓	
ボルテゾミブ	1.3 mg/m2	mg	sc		↓							↓					↓	
生理食塩液	実投与量で自動計算	0 mL																

デキサメタゾン アセトアミノフェン レスタミンはダラツムマブ開始1-3時間前に投与すること

ダラツムマブ点滴静注投与速度

投与時期	投与開始からの投与速度(mL/時間)	投与開始からの投与速度(mL/時間)			
		0-1時間	1-2時間	2-3時間	3時間以降
3回目投与以降	500mL	100	150	200	