

| レジメン名     | DBd療法 4-8クール |             |        |         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |              |      |
|-----------|--------------|-------------|--------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------------|------|
| 略名        | DBd(4-8クール)  |             |        | 1クールの日数 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 21 日         |      |
| 適応病名      | 多発性骨髄腫       |             |        | 予定クール回数 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 5回(次レジメンへ移行) |      |
| 薬品名       | 1日投与量        | 計算投与量       | 投与方法   | 投与時間    | day | day | day | day | day | day | day | day | day | day | day | day | day | day | day          | 実投与量 |
|           |              |             |        |         | 1   | 2   | ... | 4   | 5   | ... | 8   | 9   | ... | 11  | 12  | ... | 15  | ... | 21           |      |
| デキサメタゾン   | 20 mg        | 20 mg       | 経口/div |         | ↑   | ↑   |     |     | ↑   | ↑   |     |     |     | ↑   | ↑   |     |     |     |              |      |
| アセトアミノフェン | 650~1000 mg  | 650~1000 mg | 経口/div |         | ↑   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |              |      |
| レスタミン     | 30 mg        | 30 mg       | 経口     |         | ↑   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |              |      |

点滴静注の場合

|        |            |        |     |      |   |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |
|--------|------------|--------|-----|------|---|--|--|---|--|--|--|---|--|--|--|--|---|--|--|--|
| 生理食塩液  | 50 mL      | 50 mL  | div | keep | ↑ |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |
| ダラツムマブ | 16 mg/kg   | mg     | div | 4時間  | ↓ |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |
| 生理食塩液  | 500-投与量 mL | 500 mL |     |      |   |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |
| ボルテゾミブ | 1.3 mg/m2  | mg     | sc  |      | ↓ |  |  | ↓ |  |  |  | ↓ |  |  |  |  | ↓ |  |  |  |
| 生理食塩液  | 実投与量で自動計算  | 0 mL   |     |      |   |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |

皮下注の場合

|        |           |         |    |  |   |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |
|--------|-----------|---------|----|--|---|--|--|---|--|--|--|---|--|--|--|--|---|--|--|--|
| ダラツムマブ | 1800 mg   | 1800 mg | sc |  | ↓ |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |
| ボルテゾミブ | 1.3 mg/m2 | mg      | sc |  | ↓ |  |  | ↓ |  |  |  | ↓ |  |  |  |  | ↓ |  |  |  |
| 生理食塩液  | 実投与量で自動計算 | 0 mL    |    |  |   |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |

デキサメタゾン アセトアミノフェン レスタミンはダラツムマブ開始1-3時間前に投与すること

ダラツムマブ点滴静注投与速度

| 投与時期    | 投与開始からの投与速度(mL/時間) | 投与開始からの投与速度(mL/時間) |       |       |       |
|---------|--------------------|--------------------|-------|-------|-------|
|         |                    | 0-1時間              | 1-2時間 | 2-3時間 | 3時間以降 |
| 3回目投与以降 | 500mL              | 100                | 150   | 200   |       |