レジメン名	DKd療法 1クール		
略名	DKd(1)	1クールの日数	28 日
適応病名	多発性骨髄腫	予定クール回数	1回(次レジメンへ移行)

薬品名	1日投与量	計算投与量	投与方法	投与時間	day 1	day 2	day 3	day	day 8	day 9	day	day 15	day 16	day	day 21	day 22	day 23	day	day 28	実投与量
デキサメタゾン	20 mg	20 mg	経口/div		↑	↑			↑	↑		↑	↑			40mg				
アセトアミノフェン	650-1000 mg	650-1000 mg	経口/div		↑	↑			↑			↑				↑				
レスタミン	30 mg	30 mg	経口		↑	↑			↑			↑				↑				
モンテルカスト	10 mg	10 mg	経口		↑	↑			↑			↑				↑				
メドロール	20 mg	20 mg	経口				↑													
5%ブドウ糖	100 mL	100 mL	div	keep	↑	↑			↑	↑		↑	↑							
カルフィルゾミブ	20 mg/m2	mg	div	30分	↓	↓														
注射用水	実投与量で自動計算	0 mL																		
5%ブドウ糖	100-投与量mL	100 mL																		
カルフィルゾミブ	56 mg/m2	mg	div	30分					↓	↓		↓	↓							
注射用水	実投与量で自動計算	0 mL																		
5%ブドウ糖	100-投与量mL	100 mL																		
点滴静注の場合																				
生理食塩液	100 mL	100 mL	div	keep	↑	↑			↑			↑				↑				
ダラツムマブ	8 mg/kg	mg	div	4時間	↓	↓														
生理食塩液	500-投与量 mL	500 mL																		
ダラツムマブ	16 mg/kg	mg	div	4時間					↓			↓				↓				
生理食塩液	500-投与量 mL	500 mL																		
皮下注の場合																				
ダラツムマブ	1800 mg	1800 mg	sc		↓				↓			↓				↓				

75歳を超える患者の場合、デキサメタゾンの用量はday1,2,8,15,22に20mg、day9,16に8mg投与する
デキサメタゾン　アセトアミノフェン　レスタミン モンテルカストはダラツムマブ開始1-3時間前に投与すること

ダラツムマブ点滴静注投与速度

投与時期		投与開始からの投与速度(mL/時間)			
		0-1時間	1-2時間	2-3時間	3時間以降
初回投与	500mL	50	100	150	200
2-3回目投与	500mL				
4回目投与以降	500mL	100	150	200	