

レジメン名	DKd療法 2クール																	
略名	DKd(2)		1クールの日数													28 日		
適応病名	多発性骨髄腫		予定クール回数													1回(次レジメンへ移行)		
薬品名	1日投与量	計算投与量	投与方法	投与時間	day1	day2	day3	day8	day9	day15	day16	day21	day22	day23	day28	実投与量		
デキサメタゾン	20 mg	20 mg	経口/div		↑	↑		↑	↑	↑	↑							
アセトアミノフェン	650-1000 mg	650-1000 mg	経口/div		↑			↑		↑				↑				
レスタミン	30 mg	30 mg	経口		↑			↑		↑				↑				
モンテルカスト	10 mg	10 mg	経口		↑			↑		↑				↑				
5%ブドウ糖	100 mL	100 mL	div	keep	↑	↑		↑	↑	↑	↑							
カルフィルゾミブ 注射用水	56 mg/m2 実投与量で自動計算	mg 0 mL	div	30分	↓	↓		↓	↓	↓	↓							
5%ブドウ糖	100-投与量mL	100 mL																

点滴静注の場合

生理食塩液	100 mL	100 mL	div	keep	↑			↑		↑				↑		
ダラツムマブ	16 mg/kg	mg	div	4時間	↓			↓		↓				↓		
生理食塩液	500-投与量 mL	500 mL														

皮下注の場合

ダラツムマブ	1800 mg	1800 mg	sc		↓			↓		↓				↓		
--------	---------	---------	----	--	---	--	--	---	--	---	--	--	--	---	--	--

75歳を超える患者の場合、デキサメタゾンの用量はday1,8,15,22に20mg投与する

デキサメタゾン アセトアミノフェン レスタミン モンテルカストはダラツムマブ開始1-3時間前に投与すること

ダラツムマブ点滴静注投与速度

投与時期	投与開始からの投与速度(mL/時間)	投与開始からの投与速度(mL/時間)			
		0-1時間	1-2時間	2-3時間	3時間以降
4回目投与以降	500mL	100	150	200	