

レジメン名		DKd療法 3-6クール																																			
略名		DKd(3-6)																1クールの日数		28 日																	
適応病名		多発性骨髄腫																予定クール回数		4回(次レジメンへ移行)																	
薬品名	1日投与量	計算投与量	投与方法	投与時間	day 1	day 2	day 3	day 4	day 5	day 6	day 7	day 8	day 9	day 10	day 11	day 12	day 13	day 14	day 15	day 16	day 17	day 18	day 19	day 20	day 21	day 22	day 23	day 24	day 25	day 26	day 27	day 28	実投与量				
デキサメタゾン	20 mg	20 mg	経口/div		↑	↑						↑	↑							↑	↑																
アセトアミノフェン	650-1000 mg	650-1000 mg	経口/div		↑															↑																	
レスタミン	30 mg	30 mg	経口		↑															↑																	
モンテルカスト	10 mg	10 mg	経口		↑															↑																	
5%ブドウ糖	100 mL	100 mL	div	keep	↑	↑						↑	↑							↑	↑																
カルフィルゾミブ 注射用水	56 mg/m2 実投与量で自動計算	mg 0 mL	div	30分	↓	↓						↓	↓							↓	↓																
5%ブドウ糖	100-投与量mL	100 mL																																			
点滴静注の場合																																					
生理食塩液	100 mL	100 mL	div	keep	↑															↑																	
ダラツムマブ 生理食塩液	16 mg/kg 500-投与量 mL	mg 500 mL	div	4時間	↓															↓																	
皮下注の場合																																					
ダラツムマブ	1800 mg	1800 mg	sc			↓																															

75歳を超える患者の場合、デキサメタゾンの用量はday1,15,22に20mg、day8に12mg、day9に8mg投与する
 デキサメタゾン アセトアミノフェン レスタミン モンテルカストはダラツムマブ開始1-3時間前に投与すること

ダラツムマブ点滴静注投与速度

投与時期	投与速度	投与開始からの投与速度(mL/時間)			
		0-1時間	1-2時間	2-3時間	3時間以降
4回目投与以降	500mL	100	150	200	