

レジメン名	DKd療法 7クール以降																			
略名	DKd(7-)			1クールの日数															28 日	
適応病名	多発性骨髄腫			予定クール回数															PDまで	
薬品名	1日投与量	計算投与量	投与方法	投与時間	day 1	day 2	day 3	day 8	day 9	day 15	day 16	day 21	day 22	day 23	day 28	実投与量				
デキサメタゾン	20 mg	20 mg	経口/div		↑	↑		↑	↑	↑	↑									
アセトアミノフェン	650-1000 mg	650-1000 mg	経口/div		↑											40mg				
レスタミン	30 mg	30 mg	経口		↑															
モンテルカスト	10 mg	10 mg	経口		↑															
5%ブドウ糖	100 mL	100 mL	div	keep	↑	↑		↑	↑	↑	↑									
カルフィルゾミブ 注射用水	56 mg/m2 実投与量で自動計算	mg 0 mL	div	30分	↓	↓		↓	↓	↓	↓									
5%ブドウ糖	100-投与量mL	100 mL																		
点滴静注の場合																				
生理食塩液	100 mL	100 mL	div	keep	↑															
ダラツムマブ 生理食塩液	16 mg/kg 500-投与量mL	mg 500 mL	div	4時間	↓															
皮下注の場合																				
ダラツムマブ	1800 mg	1800 mg	sc		↓															

75歳を超える患者の場合、デキサメタゾンの用量はday1,22に20mg、day8,15に12mg、day9,16に8mg投与する
 デカドロン アセトアミノフェン レスタミン モンテルカストはダラツムマブ点滴静注開始1-3時間前に投与すること

ダラツムマブ点滴静注投与速度

投与時期	投与速度(mL/時間)	投与開始からの投与速度(mL/時間)			
		0-1時間	1-2時間	2-3時間	3時間以降
4回目投与以降	500mL	100	150	200	