

レジメン名	IsaKd療法		
略名	IsaKd療法	1クールの日数	28日
適応病名	多発性骨髄腫	予定クール回数	PDまで

## 1クール

薬品名	1日投与量	計算投与量	投与方法	投与時間	day	day	day	day	day	day	day	day	day	day	day	day	day	day	day	実投与量
					1	2	..	..	8	9	..	..	15	16	..	21	22	23	..	
デキサメタゾン	20 mg	20 mg	経口/iv		↓	↓			↓	↓			↓	↓			↓	↓		
5%ブドウ糖	50 mL	50 mL	div	keep	↑	↑			↑	↑			↑	↑			↑			
アセトアミノフェン	650~1000 mg	650~1000 mg	経口		↑				↑				↑				↑			
レスタミン	30 mg	30 mg	経口		↑				↑				↑				↑			
ファモチジン	20 mg	20 mg																		
イサツキシマブ	10 mg/kg	mg	div	下表参照	↓				↓				↓				↓			
生理食塩液	250-投与量 mL	250 mL																		
5%ブドウ糖	50 mL	50 mL	div	フラッシュ用	↑				↑				↑				↑			
カルフィルゾミブ	20 mg/m2	mg																		
注射用水	実投与量で自動計算	0 mL	div	30分	↓	↓														
5%ブドウ糖	100-投与量mL	100 mL																		
カルフィルゾミブ	56 mg/m2	mg																		
注射用水	実投与量で自動計算	0 mL	div	30分					↓	↓			↓	↓						
5%ブドウ糖	100-投与量mL	100 mL																		
5%ブドウ糖	50 mL	50 mL	div	フラッシュ用	↑	↑			↑	↑			↑	↑						

## 2クール目以降

薬品名	1日投与量	計算投与量	投与方法	投与時間	day	day	day	day	day	day	day	day	day	day	day	day	day	day	day	実投与量
					1	2	..	..	8	9	..	..	15	16	..	21	22	23	..	
デキサメタゾン	20 mg	20 mg	経口/iv		↓	↓			↓	↓			↓	↓			↓	↓		
5%ブドウ糖	50 mL	50 mL	div	keep	↑	↑			↑	↑			↑	↑			↑			
アセトアミノフェン	650~1000 mg	650~1000 mg	経口		↑								↑							
レスタミン	30 mg	30 mg	経口		↑								↑							
ファモチジン	20 mg	20 mg																		
イサツキシマブ	10 mg/kg	mg	div	下表参照	↓								↓							
生理食塩液	250-投与量 mL	250 mL																		
5%ブドウ糖	50 mL	50 mL	div	フラッシュ用	↑								↑							
カルフィルゾミブ	56 mg/m2	mg																		
注射用水	実投与量で自動計算	0 mL	div	30分	↓	↓			↓	↓			↓	↓						
5%ブドウ糖	100-投与量mL	100 mL																		
5%ブドウ糖	50 mL	50 mL	div	フラッシュ用	↑	↑			↑	↑			↑	↑						

前投薬はイサツキシマブ投与の15~60分前に投与すること

投与時期	投与速度(mg/時)	
	初回投与	2回目以降
投与開始 0-60分	175	175
投与開始 60-90分	225	275
投与開始 90-120分	275	375
投与開始 120-150分	325	400
投与開始 150-180分	375	400
投与開始 180分以降	400	400