

|       |        |         |      |
|-------|--------|---------|------|
| レジメン名 | Isa療法  |         |      |
| 略名    | Isa    | 1クールの日数 | 28日  |
| 適応病名  | 多発性骨髄腫 | 予定クール回数 | PDまで |

1クール目

| 薬品名                | 1日投与量                  | 計算投与量           | 投与方法 | 投与時間   | day 1 | day 2 | day .. | day 8 | day 9 | day .. | day 15 | day 16 | day .. | day 22 | day 23 | day .. | day 28 | 実投与量 |
|--------------------|------------------------|-----------------|------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| 生理食塩液              | 50 mL                  | 50 mL           | div  | keep   | ↑     |       |        | ↑     |       |        | ↑      |        |        | ↑      |        |        |        |      |
| アセトアミノフェン          | 650~1000 mg            | 650~1000 mg     | 経口   |        | ↑     |       |        | ↑     |       |        | ↑      |        |        | ↑      |        |        |        |      |
| レスタミン<br>ファモチジン    | 30 mg<br>20 mg         | 30 mg<br>20 mg  | 経口   |        | ↑     |       |        | ↑     |       |        | ↑      |        |        | ↑      |        |        |        |      |
| メチルプレドニゾン<br>生理食塩液 | 125 mg<br>50 mL        | 125 mg<br>50 mL | div  | 15分    | ↑     |       |        | ↑     |       |        | ↑      |        |        | ↑      |        |        |        |      |
| イサツキシマブ<br>生理食塩液   | 20 mg/kg<br>250-投与量 mL | mg<br>250 mL    | div  | 下表参照   | ↓     |       |        | ↓     |       |        | ↓      |        |        | ↓      |        |        |        |      |
| 生理食塩液              | 50 mL                  | 50 mL           | div  | フラッシュ用 | ↑     |       |        | ↑     |       |        | ↑      |        |        | ↑      |        |        |        |      |

2クール目以降

| 薬品名                | 1日投与量                  | 計算投与量           | 投与方法 | 投与時間   | day 1 | day 2 | day .. | day 8 | day 9 | day .. | day 15 | day 16 | day .. | day 22 | day 23 | day .. | day 28 | 実投与量 |
|--------------------|------------------------|-----------------|------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| 生理食塩液              | 50 mL                  | 50 mL           | div  | keep   | ↑     |       |        |       |       |        | ↑      |        |        |        |        |        |        |      |
| アセトアミノフェン          | 650~1000 mg            | 650~1000 mg     | 経口   |        | ↑     |       |        |       |       |        | ↑      |        |        |        |        |        |        |      |
| レスタミン<br>ファモチジン    | 30 mg<br>20 mg         | 30 mg<br>20 mg  | 経口   |        | ↑     |       |        |       |       |        | ↑      |        |        |        |        |        |        |      |
| メチルプレドニゾン<br>生理食塩液 | 125 mg<br>50 mL        | 125 mg<br>50 mL | div  | 15分    | ↑     |       |        |       |       |        | ↑      |        |        |        |        |        |        |      |
| イサツキシマブ<br>生理食塩液   | 20 mg/kg<br>250-投与量 mL | mg<br>250 mL    | div  | 下表参照   | ↓     |       |        |       |       |        | ↓      |        |        |        |        |        |        |      |
| 生理食塩液              | 50 mL                  | 50 mL           | div  | フラッシュ用 | ↑     |       |        |       |       |        | ↑      |        |        |        |        |        |        |      |

前投薬はイサツキシマブ投与の15~60分前に投与すること

| 投与時期          | 投与速度 (mg/時) |       |
|---------------|-------------|-------|
|               | 初回投与        | 2回目以降 |
| 投与開始 0-60分    | 175         | 175   |
| 投与開始 60-90分   | 225         | 275   |
| 投与開始 90-120分  | 275         | 375   |
| 投与開始 120-150分 | 325         | 400   |
| 投与開始 150-180分 | 375         | 400   |
| 投与開始 180分以降   | 400         | 400   |