

レジメン名	Isad療法		
略名	Isad	1クールの日数	28日
適応病名	多発性骨髄腫	予定クール回数	PDまで

## 1クール目

薬品名	1日投与量	計算投与量	投与方法	投与時間	day	day	day	day	day	day	day	day	day	day	day	day	実投与量
					1	2	..	8	9	..	15	16	..	22	23	..	
デキサメタゾン	40(20) mg	40(20) mg	経口/iv		↓			↓			↓			↓			
生理食塩液	50 mL	50 mL	div	keep	↑			↑			↑			↑			
アセトアミノフェン	650~1000 mg	650~1000 mg	経口		↑			↑			↑			↑			
レスタミン	30 mg	30 mg	経口		↑			↑			↑			↑			
ファモチジン	20 mg	20 mg															
イサツキシマブ	20 mg/kg	mg	div	下表参照	↓			↓			↓			↓			
生理食塩液	250-投与量 mL	250 mL															
生理食塩液	50 mL	50 mL	div	フラッシュ用	↑			↑			↑			↑			

## 2クール目以降

薬品名	1日投与量	計算投与量	投与方法	投与時間	day	day	day	day	day	day	day	day	day	day	day	実投与量
					1	2	..	8	9	..	15	16	..	22	23	
デキサメタゾン	40(20) mg	40(20) mg	経口/iv		↓			↓			↓			↓		
生理食塩液	50 mL	50 mL	div	keep	↑			↑			↑			↑		
アセトアミノフェン	650~1000 mg	650~1000 mg	経口		↑			↑			↑			↑		
レスタミン	30 mg	30 mg	経口		↑			↑			↑			↑		
ファモチジン	20 mg	20 mg														
イサツキシマブ	20 mg/kg	mg	div	下表参照	↓			↓			↓			↓		
生理食塩液	250-投与量 mL	250 mL														
生理食塩液	50 mL	50 mL	div	フラッシュ用	↑			↑			↑			↑		

前投薬はイサツキシマブ投与の15~60分前に投与すること  
75歳以上の場合、デキサメタゾンは20mg投与

投与時期		投与速度(mg/時)	
		初回投与	2回目以降
投与開始	0-60分	175	175
投与開始	60-90分	225	275
投与開始	90-120分	275	375
投与開始	120-150分	325	400
投与開始	150-180分	375	400
投与開始	180分以降	400	400