レジメン名	IsaVRd療法　2-4サイクル目　(寛解導入期間)		
略名	IsaVRd(2-4)(寛解導入期間)	1クールの日数	42 日
適応病名	多発性骨髄腫	予定クール回数	3クール(→次レジメンに移行)

薬品名	1日投与量	計算投与量	投与方法	投与時間	第1週 day 1	day 2	day	day 4	day 5	day	第2週 day 8	day 9	day	day 11	day 12	day	day 14	第3週 day 15	day	day 21	実投与量
デキサメタゾン ＊	20 mg	20 mg	経口		↑	↑		↑	↑		↑	↑		↑	↑			↑			
アセトアミノフェン	650～1000 mg	650～1000 mg	経口		↑													↑			
レスタミン	30 mg	30 mg	経口		↑													↑			
ファモチジン	20 mg	20 mg	経口		↑													↑			
生理食塩液	50 mL	50 mL	div	keep	↑													↑			
イサツキシマブ	10 mg/kg	mg	div	下表	↓													↓			
生理食塩液	250-投与量 mL	250 mL		参照																	
ボルテゾミブ	1.3 mg/㎡	mg	sc		↓			↓			↓			↓							
生理食塩液	実投与量で自動計算	0 mL																			
レナリドミド	25 mg	25 mg	経口		↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓				

薬品名	1日投与量	計算投与量	投与方法	投与時間	第4週 day 22	day 23	day	day 25	day 26	day	第5週 day 29	day 30	day	day 32	day 33	day	day 35	第6週 day 36	day	day 42	実投与量
デキサメタゾン ＊	20 mg	20 mg	経口		↑	↑		↑	↑		↑	↑		↑	↑						
アセトアミノフェン	650～1000 mg	650～1000 mg	経口								↑										
レスタミン	30 mg	30 mg	経口								↑										
ファモチジン	20 mg	20 mg	経口								↑										
生理食塩液	50 mL	50 mL	div	keep							↑										
イサツキシマブ	10 mg/kg	mg	div	下表							↓										
生理食塩液	250-投与量 mL	250 mL		参照																	
ボルテゾミブ	1.3 mg/㎡	mg	sc		↓			↓			↓			↓							
生理食塩液	実投与量で自動計算	0 mL																			
レナリドミド	25 mg	25 mg	経口		↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓				

＊75歳以上の患者のデキサメタゾンの投与は週2回(day1.4.8.11.15.22.25.29.32)