レジメン名	テクリスタマブ療法		
略名	テクリスタマブ療法	1クールの日数	漸増期:5～9日 継続投与期:7日
適応病名	多発性骨髄腫	予定クール回数	

【漸増期】

薬品名	1日投与量	計算投与量	投与方法	投与時間	day 1	day 2	day 3	day 4	day 5	day …	実投与量
デキサメタゾン	16 mg	16 mg	経口/div		↑		↑		↑		
アセトアミノフェン	650～1000 mg	650～1000 mg	経口/div		↑		↑		↑		
ジフェンヒドラミン	50 mg	50 mg	経口/div		↑		↑		↑		
テクリスタマブ	0.06 mg/kg	mg	sc		↓						
テクリスタマブ	0.3 mg/kg	mg	sc				(↓)※				
テクリスタマブ	1.5 mg/kg	mg	sc						(↓)※		

※2～4日の間隔で0.3mg/kg、1.5mg/kgの順に皮下投与

【継続投与期】

薬品名	1日投与量	計算投与量	投与方法	投与時間	day 1	day 2	day 3	day 4	day 5	day 7	実投与量
デキサメタゾン	16 mg	16 mg	経口/div		↑						
アセトアミノフェン	650～1000 mg	650～1000 mg	経口/div		↑						
ジフェンヒドラミン	50 mg	50 mg	経口/div		↑						
テクリスタマブ	1.5 mg/kg	mg	sc		↓						