

レジメン名	悪性神経膠腫アバスチン+テモダール+放射線療法																		
略名	Bev+TMZ+rad				1クールの日数						6週間(休薬4週間)								
適応病名	悪性神経膠腫				予定クール回数						1回								
薬品名	1日投与量	計算投与量	投与方法	投与時間	day	day	day	day	day	day	day	day	day	day	day	day	day	day	実投与量
					1	~	5	8	~	12	15	~	19	22	~	26			
生理食塩液	100 mL	100 mL	div	keep															
アバスチン	10 mg/kg	mg	div	90min	↓								↓						
生理食塩液	100-投与量 mL	100 mL																	
テモゾロミド	75 mg/m2	mg	経口		↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	
Radiation	2 Gy/day	2 Gy			↓	↓	↓		↓	↓	↓		↓	↓	↓		↓	↓	

薬品名	1日投与量	計算投与量	投与方法	投与時間	day												
					29	~	33	36	~	40	41	42	43	70	
生理食塩液	100 mL	100 mL	div	keep													
アバスチン	10 mg/kg	mg	div	90min	↓									↓			
生理食塩液	100-投与量 mL	100 mL															
テモゾロミド	75 mg/m2	mg	経口		↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓				
Radiation	2 Gy/day	2 Gy			↓	↓	↓		↓	↓	↓						

アバスチンの初回投与時は90分かけて点滴静注。
 2回目以降は、忍容性に応じて60分、30分とすることが可能。
 初回治療